

Ерзает на попе: когда нужен ветеринар

Если вы заметили, что собака ездит попой по ковру, это не случайная выходка, а сигнал того, что питомец ощущает зуд, боль или раздражение в задней части тела. Такое поведение ветеринары часто называют симптомом проблем с параанальными железами, кожей или пищеварительной системой. Важно не ругать собаку за это, а разобраться в причине.

Перемещаться на попе собака может и дома, и на улице — по ковру, паркету или траве. Хозяева нередко принимают это за игру или проявлением характера, но такой симптом редко бывает безобидным. Ниже мы разберём основные причины такого поведения, домашние и ветеринарные способы помощи, а также тревожные признаки, при которых нужно срочно обратиться к врачу.

Частые причины такого поведения

Если питомец елозит на попе, первое, что часто предполагают специалисты, — нарушение работы анальных мешочков. Эти железы расположены по обе стороны от анального отверстия и выделяют секрет при дефекации. Когда содержимое становится густым или выводные протоки забиваются, возникает застой, появляется давление на ткани и вызывают сильный зуд. Животное стремится облегчить состояние, прижимаясь задней частью тела к полу.

Иные возможные причины включают кожные аллергии и воспаления, заражение паразитами, болезни желудочно-кишечного тракта, травмы или инородные тела в области заднего прохода. Иногда собака катается на попе из-за блох или клещей, провоцирующих зуд у основания хвоста. У отдельных пород предрасположенность к запорам или мягкому стулу повышает риск забивания желёз. Также такое действие бывает вызвано болью в спине или тазовой области, когда животное пытается найти облегчение.

1. Застой и воспаление анальных мешочков
2. Аллергии и кожные воспаления
3. Гельминты и другие паразиты
4. Проблемы с пищеварением, запор или понос
5. Повреждения, посторонние предметы или опухоли
6. Дискомфорт в области таза и спины

Что указывает на забитые железы

Когда проблема кроется в анальных мешочках, собака не только катается на попе, но и часто вылизывается под хвостом, скулит при дефекации или испытывает трудности с туалетом. Из-под хвоста может исходить резкий неприятный запах, а на коже вокруг анального отверстия появляются покраснения или отёчность. В запущенных случаях формируется гнойник, способный прорваться и потребовать срочной помощи.

Не пытайтесь выдавливать железы самостоятельно без опыта — неправильные действия могут травмировать слизистую и усилить воспаление.

Для точной диагностики ветеринар осматривает питомца, пальпирует железы, оценивает состояние кожи и при необходимости назначает анализы. Иногда требуется цитологическое исследование, соскоб кожи или УЗИ, чтобы убедиться в отсутствии инфекций и новообразований.

Когда дело не только в железах

Когда анальные мешочки не вызывают нареканий, нужно осмотреть кожные покровы и шерсть. Пищевые аллергии, укусы паразитов, воспаление от контакта с раздражителем могут вызывать зуд в области хвоста и заставлять собаку тереться задом о поверхность. Также гельминты, особенно острицы, могут раздражать вокруг анального отверстия.

Не стоит сбрасывать со счетов проблемы желудочно-кишечного тракта. Задержка стула, диарея, воспалительные процессы в кишке изменяют характер испражнений, вызывая раздражение кожи. Если собака ездит на попе после каждого туалета, это нередко говорит о болевых ощущениях в заднем проходе или прямой кишке. Тогда нужен осмотр врача и вероятно, корректировка рациона или терапия.

Фактор Характерный признак Что делать Забытые параанальные железы Ездит на попе, вылизывается, неприятный запах Обратиться к ветеринару для очистки Аллергическая реакция или воспаление кожи Покраснение, зуд, расчёсы Убрать аллерген, показать питомца специалисту Гельминты Зуд, неоформленный стул, похудение Проверить анализы и провести обработку от паразитов Болезна кишечника Диарея, запор, боль при дефекации Соблюдать рекомендации ветеринара

Как облегчить состояние питомца

Когда питомец катается на попе, не стоит паниковать, но и оставлять без внимания нельзя. Для начала осмотрите область под хвостом: имеются ли покраснения, раны, припухлости или признаки паразитов. Если видите гнойник или сильное воспаление, не пытайтесь воздействовать и срочно звоните в клинику.

Допустимо ненадолго уменьшить дискомфорт, протирая область вокруг заднего прохода тёплым раствором ромашки или физиологическим раствором. Не используйте спиртовые настойки и не наносите гормональные препараты без назначения специалиста. Осмотрите питание: резкое изменение рациона нередко вызывает расстройство пищеварения. Если питомец на сухом корме, следите, чтобы вода всегда была в доступе.

- Осмотрите заднюю часть тела на предмет ран, шишек и покраснений
- Не вскрывайте гнойники и не давите на железы без опыта
- Ведите наблюдение за стулом и поведением
- Обратитесь к ветеринару, если симптом повторяется более двух дней

Когда нужен срочный визит к ветеринару

Не каждый случай катания на попе требует экстренного вмешательства, но существуют симптомы, при которых откладывать визит опасно. Когда вы видите кровь в области анального отверстия, гнойные выделения, сильную боль при прикосновении или повышение температуры, это повод срочно обратиться в ветклинику. Кроме того вызывает опасение ситуация, когда питомец отказывается от еды, становится вялой или у него рвота и понос.

При подозрении на абсцесс медлить нельзя: инфекция может распространиться на близлежащие ткани и вызвать сепсис. Врач может вскрыть и очистить очаг, назначить антибиотики и провести обработку раны. Когда причина кроется в болезни пищеварительного тракта, потребуется диета и медикаменты, подобранные для конкретного животного.

Меры профилактики

Чтобы собака реже ездила на попе, важно следить за здоровьем кожи и пищеварения. Периодически проводите обработку от наружных и внутренних паразитов, давайте глистогонные препараты по схеме, рекомендованной ветеринаром. Сбалансированный корм и достаточное количество воды снижают риск запоров и разжижения стула.

Помните о гигиене: после прогулок проверяйте лапы и зону под хвостом, купайте с мягким средством при нужде. Если у собаки густая длинная шерсть, подстригайте волосы вокруг заднего прохода, чтобы избежать загрязнения и раздражения. При склонности к застою параанальных желёз ветеринар может показать, как правильно ухаживать за этой зоной.

Плановые осмотры помогают вовремя заметить проблему. Даже если собака кажется здоровым, раз в год стоит проверять состояние параанальных желёз у ветеринара. Это особенно важно для пород с рыхлой кожей и складками в области хвоста.

Заключение

Езда на попе — это не каприз и не вредная привычка, а способ сообщить о дискомфорте. Следите за своим любимцем, отмечайте сопутствующие признаки и своевременно обращайтесь к врачу. Чем быстрее выяснится причина, тем легче и быстрее будет оказать помощь.

Часто задаваемые вопросы

Отчего питомец катается на попе по ковру?

Обычно причина кроется в зуде или неприятных ощущениях возле заднего прохода. Основные причины: застой параанальных желёз, аллергические реакции, глисты, заболевания кишечника. Точный диагноз поставит ветеринар после осмотра.

Насколько это серьёзно, когда собака катается на попе?

Само по себе поведение не смертельно, но оно говорит о наличии проблемы. Если не лечить застой желёз может перейти в абсцесс, а аллергия или паразиты — стать причиной тяжёлых осложнений. Поэтому важно показать собаку [срочный вызов ветеринарного врача](#) врачу.

Можно ли самому выдавливать параанальные железы?

Не советуем делать это без подготовки. Неправильное движение может травмировать слизистую и вызвать инфекцию. Эту манипуляцию должен проводить врач или специалист, прошедший обучение. Иногда **вызов ветеринара круглосуточно москва** доктор обучает владельца безопасной технике.

Как понять, что дело в параанальных железах?

При закупорке мешочков нередко возникает резкий запах, краснота и отёк возле анального отверстия. Питомец вылизывает эту зону и беспокоится при дефекации. При других причинах зуд может распространяться по всему телу, изменения стула или следы паразитов. Точный ответ даст ветеринарный осмотр.

Как поступить при гнойнике возле заднего прохода?

Срочно обратиться в ветеринарную клинику. Не вскрывайте гнойник самостоятельно: это опасно и способно вызвать заражение крови. Специалист выполнит вскрытие, дренирование и назначит

антибиотики. После лечения потребуется уход за раной по назначению.

Как не допустить, чтобы собака каталась на попе?

Да, профилактика возможна. Проводите обработку от блох и глистов, следите за рационом и наличием питья. Время от времени осматривайте анальные мешочки у специалиста. При склонности к застою доктор может посоветовать специальную диету или добавки.