

Понос у кошки: что можно сделать дома, а когда требуется срочный вызов врача

Диарея у кошки — частая причина тревоги владельцев. По виду и дополнительным симптомам можно примерно понять, насколько всё серьёзно. В одних случаях достаточно покоя и обильного питья, в других промедление опасно.

Эта статья даст ориентир, как действовать, если у кошки жидкий стул, при каких признаках нужно срочно звать врача и как не навредить до приезда доктора. Мы не заменяем осмотр врача, но поможем не растеряться.

Когда стул считается жидким

Жидкий стул — это неоформленные испражнения, которые повторяются чаще обычного. Стоит оценить частоту, оттенок, есть ли кровь, слизь, запах и как ведёт себя питомец. Единичная мягкая дефекация при хорошем аппетите — не то же самое, что многократный водянистый стул с вялостью.

Кобель или кошка может дать сбой после смены рациона, переезда, новую еду. Но диарея [вызов ветеринара круглосуточно москва](#) — лишь признак, а не отдельное заболевание. По этой причине задачу решают не закреплением стула любой ценой, а выяснением причины.

Почему у кошки может быть жидкий стул

Причины можно разделить на неопасные и те, что требуют вмешательства врача. К безопасным относят резкую смену корма, избыток еды, испуг или переезд, съеденную траву или несъедобный предмет. К более серьёзным — инфекционные заболевания, паразитов, отравление, болезни печени, почек, кишечника и инородное тело.

- Новый рацион без плавного введения
- Перекармливание или жирная пища со стола
- Испуг: переезд, новый человек в доме
- Гельминты и одноклеточные
- Отравление: недоброкачественный корм, бытовая химия
- Вирусные или бактериальные заболевания
- Проглоченный предмет в кишечнике

Некоторые состояния не заметны сразу, например микоплазменная инфекция. Такая инфекция иногда сопровождается не только диареей, но и вялостью, плохим аппетитом, выделениями. Диагноз ставит только врач после лабораторных исследований.

Как оценить состояние кошки

Осмотрите питомца: слизистые в норме розовыми, а не бледными. Проверьте эластичность кожи: если она не расправляется, вероятно обезвоживание. Посчитайте дыхательные движения в спокойном состоянии на фоне отдыха. Учащённое дыхание может быть признаком болевого синдрома, температуре или интоксикации.

ПризнакО чём может говоритьНасколько срочноЕдиничная мягкая дефекацияНередко связана с питаниемНаблюдениеЧастая водянистая дефекацияПотеря жидкостиНужен врачКровь, слизь в стулеПовреждение кишечникаСрочноСлабость, нет аппетитаСистемная реакцияСрочноРвота вместе с диареейВозможна инфекцияСрочно

Если животное прячется, агрессивно реагирует или не даёт осмотреть, не настаивайте. Запишите, что получилось увидеть. Такая информация пригодятся доктору.

Что можно сделать до приезда врача

Уберите доступ к еде на короткое время, если кошка не против, но питьё оставьте свободным. Не давайте лекарства для людей, обезболивающие или закрепляющие средства: многие из них токсичны для кошек.

1. Создайте тихое место: уберите шум и других питомцев
2. Застелите лежанку пелёнкой для контроля за испражнениями
3. Соберите сведения: что и когда ел, что произошло
4. Возьмите свежий образец стула в чистый контейнер, если получится
5. Оставайтесь на связи с врачом

Когда у животного есть рвота с кровью, ослабли или заплетаются лапы, тяжёлое или шумное дыхание или потеря сознания — не <https://chexov.net/kak-opredelit-kogda-pitomczu-nuzhna-ekstrennaya-pomoshh/> ждите и сразу вызывайте ветеринара.

Когда нужно срочно звать ветеринара

Скорую помощь нужно вызывать, если наряду с диареей есть хотя бы один тревожный признак: кровь в стуле, неукротимая рвота, выраженная слабость, отказ от воды, быстрое дыхание или болезненность живота. У котят всё развивается стремительнее, и потому ожидание особенно рискованно.

Особый повод для тревоги — отказ задних лап, дрожь или судороги. Такие признаки могут быть связаны с травмой, неврологической проблемой или отравлением, и требуют безотлагательного осмотра.

Как подготовиться к вызову

Заблаговременно приготовьте место для осмотра с нормальным освещением, соберите ветеринарный паспорт, если он имеется, данные о прививках и последнем кормлении. Если кошка получает постоянные лекарства, покажите упаковки врачу.

- Паспорт и прививочный лист
- Что и когда ел питомец
- Какие лекарства принимает
- Образец стула, если есть возможность
- Актуальный номер телефона

Беседа с врачом должен быть конкретным: опишите когда началось, как часто, что менялось в питании, какие ещё симптомы есть. Чем точнее информация, тем быстрее врач сориентируется.

Как может строиться помощь

На месте врач осматривает питомца, оценит степень обезвоживания, измерит температуру тела, проверит живот, сердце и дыхание. В зависимости от картины могут потребоваться анализы, УЗИ или капельница. Решение о госпитализации принимается индивидуально.

Если причина неопасная, лечение нередко сводится к диете и поддержке водного баланса. При инфекции возможны препараты, при паразитарных заболеваниях — средства от паразитов. Назначать их самостоятельно не следует: неправильная доза или неподходящий препарат могут навредить. Эта статья носит справочный характер и не заменяет консультацию специалиста.

Заключение

Понос у кошки — не всегда повод для паники, но всегда сигнал обратить внимание на состояние питомца. Проверьте частоту дефекации, наличие крови и слизи, поведение и аппетит: это поможет понять, можно ли наблюдать дома или нужен врач.

Часто задаваемые вопросы

Когда жидкий стул у кошки считается опасным

Опасным считают частый водянистый стул, кровь или слизь в кале, сопровождающийся рвотой, выраженной слабостью, отказом от воды или учащённым дыханием. У котят состояние меняется быстро, поэтому лучше не откладывать обращение к ветеринару.

Дают ли кошке активированный уголь при поносе

Активированный уголь иногда применяют при подозрении на отравление, но дозировка и необходимость зависят от ситуации. Давать любые лекарства без назначения рискованно. Лучше описать симптомы врачу и действовать по его рекомендации.

Как помочь кошке при подозрении на отравление до врача

До осмотра врача уберите источник токсина, обеспечьте покой и доступ к воде. Не провоцируйте рвоту без указаний специалиста. Сохраните упаковку или остатки вещества, которое могло попасть к питомцу, и покажите врачу.

Может ли микоплазмоз у кошек передаваться человеку

Микоплазменная инфекция вызывается микроорганизмами не всегда опасны для человека, но риск и пути передачи оценивает врач. При подозрении на инфекцию нужны диагностика и лечение под наблюдением специалиста. Соблюдайте гигиену при контакте с животным.

Можно ли лечить понос у кошки диетой

Лечебное питание может быть частью терапии, но подбор корма зависит от причины и состояния кошки. Резкая смена рациона сама по себе иногда провоцирует понос. Поэтому важно менять корм постепенно и согласовать рацион с ветеринаром, особенно если понос длится больше суток.

Как быть, если жидкий стул у котёнка

У котят запас жидкости небольшой, поэтому обезвоживание развивается быстрее, чем у взрослых. При жидком стуле, отказе от еды или вялости лучше сразу обратиться к ветеринару. До приезда обеспечьте

тепло, покой и доступ к воде.